

Liste rouge de Champagne-Ardenne

Branchiopodes

validée le 14 avril 2007
avis n°2007-6 du CSRPN
auteur : J-F CART

Catégorie rouge :	E : espèce en danger =	espèce menacée de disparition à très court terme
	V : espèce vulnérable =	espèce en régression plus ou moins importante mais avec des effectifs encore substantiels ou espèce à effectif réduit mais dont la population est stable ou fluctuante

noms latins	liste rouge de Champagne-Ardenne	observations
<i>Branchipus schaefferi</i> (Fisher, 1834)	E	A été trouvé dans une ornière de camp militaire. Cette espèce est plutôt méditerranéenne, mais elle a été observée en Alsace et dans l'Aisne. Les localités alsaciennes semblent avoir été détruites. Elle est rare en France.
<i>Chirocephalus diaphanus</i> (Prévost, 1803)	E	Espèce rare en France et en Europe, une dizaine de stations sont connues en Champagne, mais elles sont fortement menacées de destruction. Au moins trois mares ont été comblées en quatre ans.
<i>Chirocephalus spinicaudatus</i> (Simon, 1886)	E	Espèce endémique de la région parisienne, ses 3 seules stations connues se situent en Champagne . Elles sont toutes trois menacées par la gestion agricole.
<i>Lepidurus apus</i> (Linneaus, 1758)	V	Rare en France. En Champagne-Ardenne, il est relativement plus fréquent, mais ses stations situées dans des mares temporaires sont en forte régression. Celles de la Bassée et des ruisseaux temporaires semblent moins menacées.

noms latins	liste rouge de Champagne-Ardenne	observations
<i>Lynceus brachyurus</i> (Müller, 1776)	E	Espèce pour laquelle ne sont connues que deux stations en France . Ce sont des marais temporaires situés tous deux en Champagne . Cette espèce est très rare en Europe.
<i>Tanymastix stagnalis</i> (Linneaus, 1758)	E	Espèce rare en France, elle n'est connue que dans une mare temporaire dans l'Aube, en forêt de Fontainebleau, et en région méditerranéenne. Des découvertes récentes dans la vallée de la Loire et le Massif central ne modifient pas son statut de rareté.